



• Gabb 32 •

Le groupement des Agriculteurs BIO du Gers

## Semis de couverts sous céréales



- **Agriculteur** : Alain Gastigar à Orbessan (32)
- **Type de sol** : argilo limoneux moyen
- **Topographie et exposition** : légère pente exposé est
- **Convictions de l'agriculteur** enrichir le sol en matière organique, vie du sol, apport d'azote, couverture du sol, gestion des adventices
- **Objectif de l'itinéraire testé**: couverture du sol en été, concurrence contre les adventices (liseron notamment)

Avec le soutien financier de :



### LA CULTURE « BERCEAU » DU COUVERT

- **Culture(s)** : avoine de printemps
- **Date de densité de semis** : 19 mars 2014 5 kg/ha
- **Développement** : culture de printemps pénalisée par le trèfle
- **Date de récolte et rendement** : vers le 10 juillet, 10-15 q/ha, PS bas

### LE COUVERT

- **Espèce(s) de couverts semée(s)** : trèfle blanc
- **Mode d'implantation du couvert** : semoir à céréales (qui a une petite herse derrière => a recouvert le trèfle sans trop l'enterrer)
- **Date de semis du couvert + dose + profondeur** : 23 mars 2014 à 5 kg/ha, semé très superficiellement (0-1 cm)
- **Levée** : pas bien visible au début
- **Evolution du couvert** : 1 mois avant la récolte : trèfle bien visible, couvert dense, bonne gestion des adventices, hauteur : entre 20 et 30 cm



- **Valorisation** : restitution au sol pour qu'il se décompose
- **Gestion du couvert** : broyage en septembre 2014, laissé au sol

## **LA CULTURE APRES COUVERT OU QUI SUIV LE COUVERT**

- **Culture(s)** : soja prévu
- **Date et densité de semis**
- **Matériel de semis** :
- **Levée et développement** :
- **Rendement**
- **Si présence du couvert vivant dans la culture, comportement du couvert** :
- **Commentaires / Observations de l'agriculteur** :  
Ronds de chardons présents à la récolte ne se sont pas trop développés (concurrence du trèfle ?)